

# MENNO® HYGIENEPLAN für die Geflügelhaltung/Geflügelmast

(Nur für professionelle Anwender)



Name verantwortliche Person:  
Tel/Mobil während der Ausführung:

Hygienemaßnahmen im leeren Stall, z. B. Rein-/Raus-Verfahren, Mastbetriebe, usw. Vers. 08/09			Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
<b>Grundreinigung:</b> ▶ von Schmutz ▶ von Fettfilmen	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos	MENNO® CLEAN 1-4 % Schaumreiniger	Alle Flächen mit Schaufel und Besen von Kot, Einstreu und Futtermittelresten frei machen. Flächen einschäumen z.B. mit MENNO® Desinfektionsspritze einweichen lassen. Danach gründlich mit Hochdruckreiniger abspülen.			
<b>Grunddesinfektion:</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Pilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos, Stiefel	<b>bei unter und über 15 °C:</b> VENNO® VET 1 super 1 % VENNO® VET 1 2 % <b>vzw. bei Temperaturen über 15 °C:</b> VENNO® FF super 1 % M&ENNO® VETERINÄR B neu 1 %	Nach der Reinigung Flächen trocknen lassen (Grauschimmer des Beton). Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Desinfektionsspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			
<b>Spezielle Desinfektion:</b> ▶ gegen Wurmeier, ▶ gegen Kokzidien, ▶ gegen Cryptosporidien ▶ gegen Clostridien, ▶ gegen TBC	Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Wände bis 1 m Höhe	NEOPREDISAN® 135-1 4 % u. a. <i>eimeria tenella</i> bzw. <i>heterakis</i>	Nach der Grundreinigung bzw. Grunddesinfektion Flächen trocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Desinfektionsspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			
<b>Reinigung des Tränkwassersystems:</b> ▶ von Kalkablagerungen, ▶ von Eisenablagerungen, ▶ von Biofilmen, ▶ von Medikamenten	Tränkwasserrohrleitungssystem	MENNO® CLEAN 1-2 % Schaumreiniger	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 2 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen. Informationen zur Tränkwasserhygiene beachten.			
<b>Desinfektion des Tränkwassersystems:</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Pilze, ▶ gegen Algen	Tränkwasserrohrleitungssystem	VENNO® VET 1 super 1 %	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 4 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen. Informationen zur Tränkwasserhygiene beachten.			

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

# MENNO® HYGIENEPLAN für die Geflügelhaltung/Geflügelmast

(Nur für professionelle Anwender)



Name verantwortliche Person:  
Tel/Mobil während der Ausführung:

Allgemeine Hygienemaßnahmen		Vers. 08/09	Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
<b>Fliegenbekämpfung</b> vollautomatisch, ganzjährig	NEOPREDIZID® Spray-System fest installierte Gerätetechnik. Steuereinheit im Zentralgang bzw. Technikraum, Sprühlanzen im Kotbunker.	NEOPREDIZID® 2 % NEOPREDIZID® 10 % Spray Zusatz	Handhabung gemäß den Geräteanweisungen. Ausbringung in zeitgesteuerten Sprühintervallen, bis zu 8 Behandlungszonen durch 3 Behandlungsprogramme einstellbar. Füllstand am Schauglas/Vorratsbehälter kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen.			
<b>Fliegenbekämpfung</b> manuell, bei Bedarf	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fensterbänke, Wände, Balken und Einstreu gegen Larven	DUO 1 5 % DUO 2 5 %	Bei ersten Anzeichen des Befalls mit der Rückenspritze auf die betroffenen Flächen ausbringen.			
<b>Fliegenbekämpfung</b> manuell, mit Sofortwirkung	Ausbringung mit ROFA Feinsprühgerät	MFG-Insektizid Konz. 100 %	Zur zwischenzeitlichen Verminderung des Fliegenbefalls. Wir empfehlen die Kombination mit DUO 1 bzw. DUO 2.			
<b>Milbenbekämpfung</b> ▶ gegen rote Vogelmilbe	Auf befallenen Flächen gegen Adulte	VENNO® VM 2 %	Bei ersten Anzeichen des Befalls mit der Rückenspritze auf die betroffenen Flächen ausbringen.			
<b>Käferbekämpfung</b> ▶ gegen Käfer und kriechende Insekten	Auf befallenen Flächen	M&ENNO® K 2 %	Bei ersten Anzeichen des Befalls mit der Rückenspritze auf die betroffenen Flächen ausbringen.			
<b>Fahrzeugdesinfektion</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Pilze	Fahrzeuge von Lieferanten und Besuchern, Vorplätze Verladeflächen, Räder	<b>bei unter und über 15°C:</b> VENNO® VET 1 super 1 % <b>vzw. bei Temperaturen über 15 °C:</b> VENNO® FF super 1 %	Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung mittels Hochdruckreiniger oder direkte Ausbringung mit MENNO® Desinfektionsspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m <sup>2</sup> der angegebenen Anwendungskonzentration.			
<b>Desinfektion von Futtersilo usw.</b> ▶ gegen Viren, ▶ gegen Bakterien, ▶ gegen Pilze	Alle Silo-Vorratsflächen	<b>bei unter und über 15°C:</b> VENNO® VET 1 super 1 %	Futtermittelreste vollständig entfernen. Siloreinigung mit dem Silo-RoBoFox®. Zur Entfernung von Fettrückständen die Flächen einschäumen mit MENNO® Clean Schaumreiniger einweichen lassen. Danach abspülen und Desinfektion mit VENNO VET 1 super mindestens 6 Stunden vor Neubefüllung.			

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

# MENNO® HYGIENEPLAN für die Geflügelhaltung/Geflügelmast

(Nur für professionelle Anwender)



Name verantwortliche Person:

Tel/Mobil während der Ausführung:

Personalhygiene		Vers. 08/09	Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
<b>Personalhygiene durch Stiefeldesinfektion</b> ► gegen Viren, ► gegen Bakterien, ► gegen Pilze	Desinfektionsfußwannen am Stalleingang	VENNO® VET 1 super 1 % VENNO® OXYGEN 2 % Desinfektionsmittel	1-2x wöchentlich wechseln, Überprüfung des pH Wertes (nur bei VET 1 super möglich) mit Indikatorpapier, bei pH Werten über 3 - Produkt nachdosieren. Verschmutzte Lösungen nach Neutralisation entsorgen.			
<b>Personalhygiene durch hygienische Handwaschung</b> ► gegen Bakterien, ► gegen Pilze, ► gegen Hefen	Wandspender am Waschbecken	VENNO® DERM 3 ml	Personalhygiene zur Verminderung des Übertragungsrisikos. 3 ml VENNO® DERM 30 Sekunden ohne Wasser einreiben, anschließend 30 Sekunden unter fließendem lauwarmen Wasser aufschäumen und abspülen.			
<b>Personalhygiene durch Händedesinfektion</b> ► gegen Bakterien, ► gegen Pilze, ► gegen Hefen	Wandspender oder Dosierflasche/Taschenflsche	Manorapid® Synergy 3 ml	Anwendung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion in Bereichen mit erhöhtem Risiko der Kontamination mit Viren. Gegen Influenza A und B mit 30 Sekunden als viruzid wirksam geprüft. Personalhygiene zur Verminderung des Übertragungsrisikos. 3 ml Manorapid® Synergy 60 Sekunden einreiben.			
<b>Desinfektion für Selbstverarbeiter bzw. Selbstvermarkter entsprechend HACCP:</b> ► gegen Bakterien, ► gegen Pilze, ► gegen Viren	Decken, Wände, Böden, Geräte, Einrichtungen, Schneidmesser, Tische, Auslagen	VENNO® OXYGEN 1-2 % Desinfektionsmittel	Bei allen lebensmittelverarbeitenden Vorgängen sind die HACCP-Richtlinien einzuhalten. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Desinfektionsspritze. Flächen im Kontakt mit Lebensmitteln sind anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität nachzuspülen.			

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



**Erst desinfizieren,  
dann produzieren!**

**MENNO® Hygienemanagement**

MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH · Langer Kamp 104 · D-22850 Norderstedt · Deutschland  
 Tel: 040-5290667-0 · Fax: 040-529066766 · E-mail: info@menno.de · Internet: www.menno.de