

# VENNO<sup>®</sup> VM

## Die Milbenbekämpfung in der Geflügelhaltung

Die Hühnermilbe (rote Vogelmilbe), die nordische braune Vogelmilbe (braune Vogelmilbe) und andere, spielen für die Übertragung von Infektionskrankheiten (**Salmonellen**, Geflügelpest, u. a.) eine große Rolle. In der Nacht befallen sie das Geflügel und saugen Blut. An den Stichstellen kommt es zu Entzündungen und lang anhaltenden Juckreizen. Folgen:

### Verminderung der Aufzucht-, Mast- und Legeleistungen

Misserfolge bei der Bekämpfung der Milben beruhen häufig darauf, dass Verhaltensweisen der Milben nicht berücksichtigt werden. Als Schlupfwinkel nach dem Blutsaugen dienen Legenester, sowie Risse, Fugen und Ritzen in Stalldecken und Wänden. Milben können bis zu drei Monaten hungern. Nach Beendigung einer Lege- oder Aufzuchtperiode, verlassen die Milben den Stall. Sie verkriechen sich in schwer zugänglichen Ritzen und Fugen, um bei erneutem Aufheizen den Stall wieder zu besiedeln.

Übliche langzeitwirksame Insektizide können nur die lebende Milbe bekämpfen. Das bedeutet, dass mit langzeitwirksamen Insektiziden nur die jeweils lebende Population bekämpft werden kann. Der Nachschlupf der Milben aus deren Eiern macht eine Nachbehandlung unbedingt erforderlich!

**VENNO<sup>®</sup> VM** wirkt in der Gebrauchslösung als Kontaktmittel. Für eine optimale Bekämpfung der Milben, muss der Wirkstoff die Milben erreichen. Schmutz und Staub sind daher zu entfernen, da sonst die Wirksamkeit vermindert wird.

Keine direkte Behandlung der Tiere! Das Produkt ist ausschließlich für die Anwendung auf befallenen Stallflächen vorgesehen!




## VENNO<sup>®</sup> VM zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügelställen

**Wirkstoffe:** Bifenthrine 15 g/l und  
Piperonylbutoxid 150 g/l

**Anwendungs-  
konzentration:** 2 %  
2 l auf 100 l Wasser

**Aufwandmenge:**  
0,2 l/m<sup>2</sup> Fläche gut befeuchten bis  
tropfnass

**Anwendung:**  
Milbennester mit feinem Hochdruck-  
strahl durchtränken. Schmutz und  
Staub entfernen. Behandlung nach  
6-8 Tagen wiederholen.



Bildl. Darstellung: rote Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) etwa 0,7 bis 1 mm groß, gelblich bis braun, nach dem Blutsaugen rötlich bis schwarz

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH

Langer Kamp 104 • D-22850 Norderstedt • Postfach: 3310 • D-22826 Norderstedt • Deutschland  
Tel: 040 529 06 67-0 • Fax: 040 529 06 67 66 • E-mail: [info@menno.de](mailto:info@menno.de) • Internet: [www.menno.de](http://www.menno.de)